

Przeciwwskazania do zabiegu permanentnego

Przeciwwskazania bezwzględne (zabieg całkowicie wykluczony):

1. Ciąża i karmienie piersią – hormony mogą wpływać na gojenie się skóry i trwałość pigmentu.
2. Aktywne choroby skóry – np. łuszczyca, egzema, atopowe zapalenie skóry, trądzik ropowiczy lub opryszczka w okolicy brwi.
3. Nowotwory złośliwe i łagodne – w trakcie leczenia lub chemioterapii.
4. Choroby zakaźne – np. HIV, WZW typu B i C.
5. Hemofilia lub inne zaburzenia krzepnięcia krwi – ryzyko niekontrolowanego krwawienia i trudności w gojeniu.
6. Alergia na barwniki lub środki stosowane podczas zabiegu – ryzyko silnej reakcji alergicznej.
7. Cukrzyca niewyrównana – trudności z gojeniem się ran.
8. Stany zapalne lub infekcje skóry w obszarze brwi (np. ropnie, aktywne infekcje bakteryjne).
9. Choroby psychiczne – np. silne zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, które mogą wpływać na akceptację efektów zabiegu.
10. Skłonność do bliznowców (keloidów) – ryzyko nieprawidłowego gojenia i powstawania zgrubień skóry.
11. Epilepsja – zabieg może być stresujący i wywołać napad.
12. Świeżo wykonane zabiegi laserowe w obszarze twarzy – należy odczekać kilka miesięcy, aby skóra w pełni się zregenerowała.

Przeciwwskazania względne (wymagają konsultacji z zabiegowcem lub lekarzem):

1. Cukrzyca wyrównana – należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym i zachować szczególną ostrożność.
2. Nadciśnienie tętnicze – ryzyko obrzęków i problemów z gojeniem.
3. Leki rozrzedzające krew – np. aspiryna, heparyna – mogą powodować nadmierne krwawienie podczas zabiegu.

1. Retinoidy (witamina A) – stosowane doustnie lub miejscowo mogą wpływać na skórę; należy odczekać co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu kuracji.
2. Choroby autoimmunologiczne – np. toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów – mogą wpływać na gojenie i trwałość pigmentu.
3. Alergie skórne – np. na środki do dezynfekcji, lateks, pigmenty – wymagają wcześniejszego testu alergicznego.
4. Niedawno wykonane zabiegi estetyczne – np. botoks, kwas hialuronowy – należy odczekać co najmniej 2-4 tygodnie.
5. Poparzenia słoneczne lub świeża opalenizna – skóra musi być w pełni zregenerowana.
6. Skóra bardzo wrażliwa lub naczynkowa – ryzyko podrażnień i dłuższego procesu gojenia.
7. Zaburzenia hormonalne – np. związane z menopauzą lub problemami z tarczycą, mogą wpływać na trwałość pigmentu.
8. Niedawno wykonane peelings chemiczne – należy odczekać 4-6 tygodni.
9. Przyjmowanie sterydów – doustnie lub miejscowo – osłabiają skórę i mogą powodować problemy z gojeniem.
10. Skóra z trądzikiem aktywnym w okolicy brwi – należy wyleczyć zmiany zapalne przed przystąpieniem do zabiegu.
11. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych i uspokajających – mogą wpływać na reakcję skóry i percepcję efektów.
12. Miesiączka – skóra jest bardziej wrażliwa na ból, co może zwiększać dyskomfort podczas zabiegu.
13. Przebyte zabiegi chirurgiczne w okolicy twarzy – np. lifting – wymaga oczekania kilku miesięcy.
14. Blizny w obszarze brwi – pigment może nierównomiernie się osadzać, konieczna jest indywidualna ocena.
15. Choroby tarczycy – niektóre problemy hormonalne mogą wpływać na trwałość barwnika.